

## CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 4 / 2021

### CARGO

## MÉDICO – FAMÍLIA E COMUNIDADE

### INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

- \* Verifique se este caderno contém 25 questões. Caso não contenha, solicite imediatamente ao fiscal de sala outro caderno.
- \* Você dispõe de 2 horas para responder a todas as questões.
- \* Para cada questão existe apenas uma resposta certa.
- \* Poderá utilizar a grade ao final do caderno para marcar previamente as respostas.
- \* Transcreva as respostas para o cartão resposta, preenchendo totalmente o círculo com caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro, não sendo permitido o uso de caneta porosa ou corretivo líquido.
- \* O telefone celular desligado, controle remoto e relógio devem estar dentro do envelope devidamente identificado e lacrado.
- \* Para se dirigir ao fiscal, erga o braço e aguarde o atendimento.
- \* Não é permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico dentro do prédio de provas, mesmo após a entrega da prova.
- \* Durante a realização da prova não será permitido o uso de livros, manuais, impressos, anotações, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular de qualquer tipo, BIP, MP3 player ou similar, gravador ou qualquer outro receptor de dados ou mensagens, qualquer tipo de controle remoto, protetor auricular, fones de ouvido, prótese auditiva, óculos com lentes escuras, relógio ou qualquer acessório na cabeça.
- \* É proibido fumar no interior do prédio de provas.
- \* O cartão resposta, se danificado pelo candidato não será substituído.
- \* A entrega da prova só poderá ocorrer depois de transcorrida uma hora do horário de início.
- \* Ao terminar a prova, deverá ser entregue, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, seu cartão resposta devidamente assinado, podendo levar consigo o caderno de questões.
- \* Após a entrega da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do prédio de aplicação da prova, não sendo permitido, nesse local, o uso dos sanitários.
- \* Será excluído do concurso o candidato que agir com incorreção ou descortesia com qualquer pessoa da equipe encarregada da aplicação das provas ou candidato participante do processo.
- \* Os dois últimos candidatos que permanecerem em sala de prova, só poderão retirar-se conjuntamente e após sua assinatura na ata de presença.



1. Assinale a opção **falsa** a respeito da tomada de decisão clínica:

- a) O médico tem que avaliar o contexto em que o paciente está inserido;
  - b) A fisiopatologia da doença investigada faz parte dos itens a serem levados em consideração;
  - c) O paciente deve participar da tomada de decisão acerca do tratamento de seu problema de saúde ou sobre quais exames devem ser feitos;
  - d) Dentro dos níveis de evidência disponíveis, as melhores evidências vêm de metanálises de Ensaios Clínicos Randomizados.
  - e) A medicina baseada em evidência é hoje o método decisivo na tomada de decisão, devendo ser o método maior a ser levado em consideração.
- 

2. De acordo com os níveis de prevenção, qual alternativa é a correta?

- a) A prevenção quaternária pode ocorrer quando a pessoa acha que está doente, mas, de acordo com a visão médica, não está;
  - b) Vacinação é considerada Prevenção Terciária;
  - c) Nos momentos em que a pessoa pensa não estar doente e o médico pensa que a pessoa possa estar, temos ações de Prevenção Terciária;
  - d) A Prevenção Secundária sempre ocorre no nível das especialidades focais;
  - e) Todas as ações preventivas são de atuação exclusiva do profissional médico.
- 

3. Quanto à Relação Médico-Pessoa, podemos afirmar que:

- a) A relação médica se dá com a pessoa, independente de sua família ou comunidade em que ela está inserida;
  - b) O fundamento da relação médica é o humanismo, o qual enxerga o homem em seus componentes físicos, químicos, biológicos, mentais, psicológicos, emocionais, espirituais e sociais;
  - c) A relação médico-sociedade nunca serve como instrumento de difusão e de manutenção do poder do Estado e da instituição médica sobre a sociedade.
  - d) O médico é o principal membro de uma equipe responsável pelos cuidados de saúde de uma pessoa, devendo dar conta de todos os problemas que a pessoa apresenta.
  - e) O médico deve sempre pautar sua prática na excelência diagnóstica, independente da relação médico-pessoa.
-

4. De acordo com a abordagem para mudança de hábitos no adulto, podemos afirmar que:
- a) O apelo ao medo é uma das formas mais eficazes de abordagem para mudança de hábitos;
  - b) De acordo com o modelo transteórico, o paciente deve sempre estar motivado a mudança de hábitos;
  - c) O tabagismo é um dos hábitos que tem maior impacto na morbimortalidade;
  - d) Nos casos de recaída, devemos deixar o paciente arcar com a consequência da sua decisão.
  - e) A entrevista motivacional é uma técnica para a mudança de hábitos, que deve sempre ser realizada pelo profissional psicólogo.

---

5. Rodrigo, 32 anos, casado, há 3 meses, vem sendo tratado para transtorno depressivo maior com fluoxetina 20 mg 1x/dia. Na última consulta, o paciente queixou-se de que, há algumas semanas, vem tendo problemas na relação sexual com a esposa, pois sentiu perda do desejo sexual e demora maior para ejaculação. Qual seria a conduta correta?

- a) Orientar que esse sintoma pode ser um efeito colateral do tratamento e que seria possível reduzir com o uso concomitante da Bupropiona 150mg.
- b) Sinalizar que o paciente pode estar tendo esse sintoma como algo novo do transtorno depressivo e recomendar paciência com o tempo de tratamento.
- c) Suspender o uso da Fluoxetina imediatamente, considerando que o paciente demonstra não ter mais o transtorno depressivo.
- d) Encaminhar o paciente para o psiquiatra, considerando a existência de novo sintoma que representa piora do transtorno depressivo.
- e) Iniciar Clonazepam 0,5 mg, à noite, pensando em sintomas de ansiedade associados à depressão.

6. Maria Joana, 16 anos, vem à consulta por queixa de corrimento vaginal há 2 semanas. Junto com o sintoma, refere mau cheiro intenso. A paciente nega prurido vaginal, dor pélvica e alteração de ciclo menstrual. Durante a entrevista, ela refere morar com os pais, não ter parceiro e ainda não manter relações sexuais. Ao exame físico, o médico verifica, na inspeção vaginal, um corrimento com odor fétido, sem outras alterações vulvares. Não realiza exame especular ou toque. Demais aspectos do exame físico, sem alterações. Conforme o caso exposto, qual seria a conduta adequada?

- a) Pensar em abuso sexual, solicitar testes sorológicos para ISTs e encaminhar para avaliação psicológica;
- b) Encaminhar a paciente ao ginecologista para realização de mais exames e solicitar testes sorológicos para ISTs.
- c) Orientar sobre candidíase vaginal e prescrever fluconazol 150 mg dose única;
- d) Diagnosticar como vaginose bacteriana, explicar que pode ocorrer em mulheres virgens e prescrever metronidazol;
- e) Chamar os pais da paciente e apenas tomar alguma conduta na frente deles.

---

7. João, 20 anos, solteiro, vem à Unidade Básica de Saúde com queixa de “espinha” em pênis há 3 dias. Refere que faz uso eventual de preservativo. Ao exame físico apresenta úlcera genital única, sem evidência de lesões vesiculares. No município, não há acesso aos exames laboratoriais necessários para investigação do caso. Qual o tratamento adequado?

- a) Doxiciclina 100mg, via oral, 01 comprimido, 2 vezes ao dia, por 7 dias + Penicilina benzatina 24 milhões de UI, intramuscular, divididas em 2 injeções, 1 em cada nádega.
- b) Azitromicina 500 mg, 02 comprimidos, via oral, em dose única + Ceftriaxona 500 mg, intramuscular, dose única.
- c) Ciprofloxacina 500 mg, 01 comprimido, via oral, duas vezes ao dia, por 3 dias + Ceftriaxona 500 mg, intramuscular, dose única.
- d) Ciprofloxacino 500 mg, via oral, duas vezes ao dia por 7 dias + Doxiciclina 100 mg, via oral, duas vezes ao dia por 21 dias.
- e) Azitromicina 500 mg, 02 comprimidos, via oral, em dose única + Penicilina benzatina 2,4 milhões de UI, intramuscular, divididas em 2 injeções, 1 em cada nádega.

8. Com relação aos cuidados com polifarmácia, leia as afirmativas abaixo e coloque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Idoso que faz uso de diurético, especialmente se também usar IECA e ácido acetilsalicílico/AINEs, tem maior risco de lesão renal aguda ao sofrer doença intercorrente.

( ) Quando for possível suspender as estatinas, o medicamento deve ser retirado de forma gradual para minimizar os riscos.

( ) Quando possível suspender o inibidor de bomba de prótons, deve-se orientar a suspensão imediata dessa droga, sem necessidade de retirada gradual.

( ) A suspensão de psicotrópicos está associada a uma diminuição de quedas e melhora da função cognitiva.

( ) Uso de antibióticos pode aumentar o risco de morte súbita nos primeiros dias de uso, em pacientes em uso de inibidores da EAC ou bloqueador de receptor de angiotensina.

A sequência, de cima para baixo, que completa os parênteses corretamente é a da alternativa

a) F – V – F – V – F

b) V – V – F – V – V

c) F – F – V – F – V

d) V – F – V – V – F

e) V – V – V – F – F

---

9. Leia as alternativas abaixo:

I. Entendendo a pessoa como um todo;

II. Intensificando a relação entre pessoa e médico;

III. Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença;

IV. Oferecendo cuidado por equipe interprofissional;

V. Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.

São considerados componentes do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP):

a) Alternativas I, III, IV e V.

b) Alternativas I, II, IV e V.

c) Alternativas I, II, III e V.

d) Alternativas I, II, III e IV.

e) Todas as alternativas acima.

10. Dona Aurea, 64 anos, procura a Unidade Básica de Saúde relatando que tem se sentido mal cada vez que precisa sair de casa, quando sente que o coração dispara, começa a transpirar e tem ondas de calor. Refere que seu filho foi internado, há 3 meses, na UTI COVID, onde permaneceu por 20 dias em estado grave e que, nesse período, começou a sentir-se meio zozza, com sensação de “cabeça oca” e muito distraída. Tais sintomas foram desaparecendo com o tempo, mas passou a sentir-se mal cada vez que sai de casa. Diz que basta voltar para casa para os sintomas irem desaparecendo. A partir do relato, qual o diagnóstico provável?

- a) Transtorno de pânico
  - b) Transtorno de estresse agudo
  - c) Transtorno de ansiedade generalizada
  - d) Transtorno de adaptação
  - e) Transtorno obsessivo-compulsivo
- 

11. O “Teste do Relógio” é bastante usado na prática de avaliação geriátrica, tendo objetivo de avaliar:

- a) Habilidade motora
  - b) Humor
  - c) Inteligência
  - d) Equilíbrio
  - e) Estado cognitivo
- 

12. São considerados medicamentos de primeira escolha para tratamento da hipertensão arterial sistêmica:

- a) Diuréticos tiazídicos, inibidores dos canais de cálcio, betabloqueadores, antagonistas dos receptores de angiotensina II e inibidores da enzima conversora da angiotensina.
  - b) Diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora da angiotensina, betabloqueadores e inibidores dos canais de cálcio.
  - c) Diuréticos em geral, betabloqueadores, inibidores dos canais de cálcio, antagonistas dos receptores de angiotensina II e inibidores da enzima conversora da angiotensina.
  - d) Diuréticos tiazídicos, inibidores dos canais de cálcio, antagonistas dos receptores de angiotensina II e inibidores da enzima conversora da angiotensina.
  - e) Antagonistas dos receptores de angiotensina II, inibidores da enzima conversora da angiotensina e diuréticos.
-

13. Assinale a alternativa **CORRETA** relacionada às conjuntivites:

- a) Podem manifestar-se clinicamente por uma sensação de corpo estranho.
  - b) A conjuntivite alérgica tem como característica a presença de secreção serosa.
  - c) O tempo de evolução da conjuntivite bacteriana gira em torno de 7 a 10 dias.
  - d) Conjuntivite bacteriana costuma cursar com baixa acuidade visual no olho afetado.
  - e) Conjuntivite fúngica deve ser tratada na atenção básica com antifúngicos tópicos.
- 

14. Bruna, 36 anos, vem à consulta solicitando orientações para realizar contracepção. Diz que, desde que se separou do marido, nunca mais teve relações sexuais, mas que começou namoro há 3 meses e quer se proteger contra gestação. Tem dois filhos vivos, história de doença inflamatória pélvica e de corrimento enquanto era casada. Tabagista (20 cigarros/dia), diz que caminha três vezes por semana. Sem outros problemas de saúde. Leia as alternativas abaixo sobre métodos contraceptivos:

- I. Anticoncepcional oral combinado
- II. Ligadura tubária
- III. DIU
- IV. Anticoncepcional injetável trimestral

Quais as alternativas acima estão indicadas para Bruna?

- a) Apenas as alternativas I, II e IV
  - b) Apenas as alternativas I e II
  - c) Apenas as alternativas III e IV
  - d) Apenas as alternativas II, III, IV
  - e) Todas as alternativas
- 

15. O médico de família e comunidade deve se utilizar de estratégias que promovam e facilitem as narrativas dos pacientes. Entre elas, encontra-se o desvelamento. Assinale a alternativa correta relacionada a essa estratégia específica:

- a) É um processo de escuta ativa, para permitir a expressão verbal e não verbal.
  - b) É considerado o processo de organizar pensamentos caóticos, permitindo que os estressores sejam interpretados e avaliados.
  - c) É o uso de metáforas como recursos de linguagem para felicitar a narrativa.
  - d) Diz respeito ao ato de a pessoa registrar, por meio da escrita, aspectos e eventos estressantes significativos da sua vida.
  - e) Refere-se à utilização do genograma para facilitar o entendimento da narrativa.
-

16. O médico de família e comunidade (MFC) é o responsável por cuidados abrangentes, deve acolher as pessoas que o procuram, sendo clinicamente competente para prestar a maior parte dos seus cuidados. Considerando o papel do MFC e os princípios de sua prática, assinale a opção **INCORRETA**:

- a) O MFC deve valorizar a complexa mistura de elementos físicos, emocionais e sociais no cuidado às pessoas.
  - b) Na prática, tem que ser habilidoso no compromisso de educação sobre os processos de doença para usuários e familiares.
  - c) Seu escopo de conhecimentos é composto da soma dos conhecimentos das outras especialidades médicas.
  - d) Deve ser capaz de atuar como coordenador dos recursos de saúde no atendimento à pessoa.
  - e) O aspecto essencial da MFC é clínico com foco principal na assistência à saúde.
- 

17. Considerando a prática do médico de família (MFC), alguns elementos caracterizam a assistência prestada, como tipo de prática, continuidade do cuidado e história natural dos adoecimentos que se apresentam comumente. Tomando por base esses elementos, assinale a opção que contempla somente características de MFC e sua prática clínica.

- a) Foco centrado na doença, continuidade mínima e problemas iniciais pouco específicos.
  - b) Continuidade sustentada, foco centrado na pessoa e problemas mais definidos, normalmente vistos mais tarde na história da doença.
  - c) Problemas normalmente vistos no início, foco centrado na pessoa e continuidade mínima.
  - d) Continuidade mínima, problemas vistos mais tardiamente e mais específicos e foco centrado na pessoa.
  - e) Continuidade sustentada, casos vistos no início com problemas pouco definidos e foco na pessoa.
- 

18. A Atenção Primária à Saúde (APS) é o cenário onde são enfrentados problemas frequentes na população em um ambiente de alta complexidade. Assinale a opção que contenha somente atributos da APS.

- a) Acesso, coordenação e longitudinalidade.
  - b) Regionalização, acesso e integralidade.
  - c) Resolubilidade, longitudinalidade e acesso.
  - d) Coordenação, hierarquização e controle social.
  - e) Equidade, acesso e integralidade.
-

19. Sobre Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a opção **CORRETA**:

- a) Não dar resposta à demanda reprimida é adequado do ponto de vista da gestão da clínica.
  - b) Quando se priorizam grupos para a assistência (crônicos, crianças), em programas, concentrando esforços nesses atendimentos em detrimento de outros, tende-se a ter uma APS de altíssima qualidade.
  - c) No Brasil, o papel do médico para a boa gestão da clínica deveria ser mais focado na prevenção primária e secundária do que no enfoque assistencial.
  - d) O grande objetivo da gestão da clínica é diminuir, para o médico, a demanda administrativa e ampliar a demanda assistencial.
  - e) Na gestão da clínica adequada, deve-se considerar propor intervenções reservadas a pessoas de maior risco para toda a população.
- 

20. Assinale a opção que contenha a correspondência **CORRETA** entre os níveis de envolvimento familiar pelo médico de família e comunidade (nível, objetivo, situação de saúde e intervenção), considerando a abordagem familiar.

- a) Aconselhamento e manejo sistêmico em situações como tabagismo, terapia familiar.
  - b) Mínimo contato com a família em casos de problemas relacionais, intervenção de entrevista motivacional.
  - c) Troca de informações e escuta das preocupações, problemas relacionais, contato familiar por questões médico-legais.
  - d) Contenção emocional, apoio e suporte em situações como abuso do álcool e drogas, depressão e ansiedade, visitas domiciliares e grupos de autoajuda.
  - e) Terapia de família em questões como sobrepeso, intervenção psicossocial.
- 

21. Considerando a matriz de competências esperadas de um médico de família e comunidade (MFC) na abordagem comunitária, assinale a opção que **NÃO** contenha uma dessas competências:

- a) Analisar historicamente o processo de formação da comunidade.
  - b) Separar a assistência de pessoas vulneráveis das não vulneráveis.
  - c) Identificar as redes de apoio existentes na comunidade.
  - d) Construção de ecomapa da comunidade.
  - e) Identificar barreiras ao serviço de saúde.
-

22. Considere as assertivas abaixo sobre o trabalho em equipe na estratégia de saúde da família.

- I. O médico de família é quase sempre visto como uma figura de liderança na equipe, tendo que saber como é reconhecido por seus pares e por sua comunidade.
- II. Trabalho interdisciplinar é um recurso estratégico de organização do trabalho e de coordenação conjunta do cuidado.
- III. O médico de família e comunidade não deve temer o compartilhamento de saberes e a oportunidade de aprender junto para melhores resultados nas propostas terapêuticas.

Está(ão) Correta(s):

- a) I e II
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) II e III
- e) I, II e III

---

23. Considerando a prevenção de doenças cardiovasculares, analise as seguintes situações e assinale a opção que contenha a ordem **CORRETA**, respectivamente, do nível de prevenção a que se relaciona a situação: Prescrição de aspirina para paciente fumante sem doença cerebrocardiovascular, tratar sequela de paciente com acidente vascular cerebral, realizar tratamento da hipertensão visando prevenir um infarto agudo do miocárdio e tratar a hipertensão em um paciente infartado para reduzir a chance de complicações do infarto.

- a) Primária, terciária, primária e terciária
- b) Primordial, terciária, secundária e primária
- c) Secundária, secundária, primária e terciária
- d) Primária, terciária, primária e primária
- e) Terciária, secundária, secundária e primária

24. No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal deve ser organizada para atender às reais necessidades da população de gestantes, mediante utilização dos conhecimentos técnico-científicos existentes e dos meios e recursos disponíveis mais adequados para cada caso. Os cuidados na gravidez devem ir além das consultas periódicas. O estilo de vida que a mulher adota entre essas visitas faz toda a diferença. Estar alerta ao corpo e se manter saudável são medidas que contribuem – e muito – para uma gestação tranquila, um parto seguro e uma recuperação mais rápida. Nesse contexto, marque a opção **CORRETA**:

- a) Exercícios físicos devem ser desestimulados, uma vez que aumentam o risco de parto prematuro e pioram a lombalgia.
- b) As gestantes devem ser vacinadas para hepatite C durante o pré-natal, uma vez que a infecção pelo vírus durante a gestação está associada à síndrome de malformações congênitas, restrição do crescimento fetal e óbito fetal.
- c) É importante a gestante receber informações sobre o aleitamento materno e técnicas de amamentação durante as consultas de pré-natal.
- d) A gestante deve ser orientada a reduzir o consumo de álcool durante o pré-natal. A dose diária não pode ultrapassar 100 g de álcool por semana.
- e) Revisões dentárias da gestante devem ser recomendadas somente após o pré-natal, pois não há medida efetiva para ser feita com relação a esse cuidado durante o pré-natal.

---

25. Sobre os problemas comuns na criança, considere as assertivas abaixo:

- I. Não há necessidade de realização de exames complementares para confirmação do diagnóstico de Monilíase oral.
- II. A icterícia fisiológica reflete uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina indireta e tem início tardio, após 24 horas de vida, ou seja, torna-se visível no segundo ou no terceiro dia de vida.
- III. Em casos mais graves de dermatite de fraldas, podem surgir lesões vesículo-erosivo-ulcerativas, conhecidas como dermatite de Jacquet.

Está(ão) Correta(s):

- a) I, II e III
- b) I e II
- c) Apenas II
- d) Apenas III
- e) II e III







	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					